



## 8.2.6 Støtteark til ultralyd undersøkelse – utvidet undersøkelse

Case id: \_\_\_\_\_ Visitt nr: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_ Undersøker: \_\_\_\_\_

	Høyre		Venstre	
	BM <sup>1</sup>	PD <sup>2</sup>	BM	PD
Albue posterior				
Albue anterior				
Håndledd, radiokarpalt				
Håndledd, midtkarpalt				
MCP2				
MCP3				
PIP2 dorsal				
PIP2 volar				
PIP3 dorsal				
PIP3 volar				
Hofte		X		X
Kne 30°suprapatellar				
Kne 30°parapatellar, late				
Kne 0°suprapatellar,				
Kne 0°parapatellar, late				
Talocruralt				
Talonavikular				
Subtalar mediant				
Subtalar lateralt				
MTP2				
MTP3				
Tibialis posterior <sup>3</sup> (0-1)				
Peroneus (0-1)				

<sup>1</sup> BM synovitt i ledd skåres fra 0 – 3 i henhold til beskrevet skåringssystem og atlas.

<sup>2</sup> PD skåres 0 -3, kun ved GS ≥ 1.

<sup>3</sup> Tenosynovitt GS skåres som ikke tilstede (0) eller tilstede (1). Dersom GS tenosynovitt er tilstede skåres PD 0 eller 1.